

PRÆEKLAMPSI SCREENING

- Screeningsflow for sonografer på rigshospitalet

Velkomst og info

Forklar formålet med screeningen og afklar, om den gravide ønsker at blive screenet.

Formål: At identificere gravide i øget risiko for at udvikle præeklampsi og tilbyde dem forebyggende behandling med hjertemagnyl

Screening

- Indfør anamnese og BT fra den hvide seddel
- Udfør aa. uterinae flows
- PlGF indhentes
- Udregn risiko som vanligt og tjek præeklampsi-risiko

Se også
Guide til aa. uterinae flowmåling

Screeningssvar

- Lav risiko ($<1/120$):
Informér den gravide om lav risiko for præeklampsi og afslut
- Øget risiko ($\geq 1/120$):
Informér den gravide om øget risiko for præeklampsi, og læg patientinfo til CKE/MH

Dokumentation

- Anvend standardnotat i Astraia:
"PE screening lav/høj risiko"

Sådan kan du informere

Screeningen viser, at du har en øget risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning. Selvom risikoen er forhøjet, er det ikke sikkert, at du bliver syg. Vi vil gerne tilbyde dig forebyggende behandling med Hjertemagnyl for at reducere risikoen. En læge vil ringe til dig for at forklare mere og udskrive behandlingen

Særlige situationer

Den gravide er allerede i behandling med Hjertemagnyl: Fortsættes i ASA-behandling uanset screeningssvar

Gravid med kontraindikationer til hjertemagnyl: Anfør dette på papiret til CKE/MH

Find mere information om præeklampsi-screening på www.prepred.dk eller scan QR-koden:



Dansk Føtalmedicinsk Selskab

